

Häufig auftretende Infektionskrankheiten in der Kita

Infektionskrankheit	Inkubationszeit	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung nach Erkrankung	Ärztliches Attest erforderlich*	Ausschluss von Kontaktpersonen	Meldepflichtig	Impfung gem. STIKO empfohlen
Magen-Darm-Erkrankungen							
Noroviren	1-3 Tage	Bis zu 48 Stunden nach Ende der Symptomatik (Ausscheider)	48 Stunden nach Ende der Symptomatik	Nein	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik	Ja, auch Verdachtsfälle	
Rotaviren	1-3 Tage	Bis zu 48 Stunden nach Ende der Symptomatik (Ausscheider)	48 Stunden nach Ende der Symptomatik	Nein	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja
Salmonellen	6-72 Stunden		Nach Ende der Symptomatik	Nein	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik	Ja, auch Verdachtsfälle	
Masern, Mumps, Röteln, Varizelle							
Masern	8-10 Tage bis zum Beginn des katharrischen Stadiums, 14 Tage bis zum Ausbruch des Hautausschlages	3-5 Tage vor Beginn des Hautausschlages und bis 4 Tage nach Auftreten, Infektiös vor Ausbruch	Nach Genesung und frühestens am 5. Tag nach Beginn des Ausschlags	Nein	Nach Rücksprache mit einem Arzt/ Gesundheitsamt, entfällt bei Immunität/Impfung	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja
Mumps	16-18 Tage (12-25 möglich)	Bis zu 9 Tage nach Beginn der Drüenschwellung, Infektiös vor Ausbruch	Nach Genesung, frühestens 9 Tage nach Schwellung der Ohrspeicheldrüse	Nein	Nach Rücksprache mit einem Arzt/ Gesundheitsamt, entfällt bei Immunität/Impfung	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja
Röteln	14-21 Tage	Bis zum Beginn des Ausschlags, Infektiös vor Ausbruch	Nach Ende der Symptomatik	Nein	Nach Rücksprache mit einem Arzt/ Gesundheitsamt, entfällt bei Immunität/Impfung	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja
Windpocken (Varizelle)	8-21 sind möglich	Bis 7 Tage nach Auftreten des Hautausschlages, Infektiös vor Ausbruch	Eine Woche nach Krankheitsbeginn möglich	Nein	Nach Rücksprache mit einem Arzt/ Gesundheitsamt, entfällt bei Immunität/Impfung	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja
Ansteckende Leberentzündungen							
Hepatitis A	25-30 Tage (möglich 15-50 Tage)	Bis 1 Woche nach Beginn der Gelbsucht, Infektiös vor Ausbruch	Nach Rücksprache mit Arzt/Gesundheitsamt	Nein	Nach Rücksprache mit einem Arzt/ Gesundheitsamt, entfällt bei Immunität/Impfung	Ja	Ja, aber keine Standard-Impfung für Kinder
Hepatitis E	15-60 Tage	Bis 1 Woche nach Beginn der Gelbsucht, Infektiös vor Ausbruch	Nach Rücksprache mit Arzt/Gesundheitsamt	Nein	Nach Rücksprache mit Arzt/Gesundheitsamt	Nein	
Keuchhusten	9-10 Tage (6-20 möglich)	Ohne Behandlung (Antibiotikum) 3 Wochen, mit Behandlung 3-7 Tage, Infektiös vor Ausbruch	5 Tage nach Beginn der antibiotischen Therapie, sonst 3 Wochen nach Hustenbeginn	Nein	Wenn Husten auftritt (ärztliche Abklärung erforderlich)	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja
Infektionen mit Streptokokken							
Ansteckende Borkenflechte	1-3 Tage	24 Stunden nach Beginn einer Therapie (Antibiotikum)	24 Stunden nach Beginn der Therapie, ansonsten nach Abheilung der befallenen Hautstellen	Nein	Nicht erforderlich	Ja, auch Verdachtsfälle	
Scharlach	1-3 Tage	24 Stunden nach Beginn einer Therapie (Antibiotikum)	24 Stunden nach Beginn der Therapie, ansonsten nach Abheilung der befallenen Hautstellen	Nein	Nicht erforderlich	Ja, auch Verdachtsfälle	
Krätze (Skabies)	2-5 Wochen	So lange ansteckend, wie lebendige Krätzmilben nachzuweisen sind	nach Behandlung	Ja (Bestätigung dass Behandlung stattfindet)	Möglich, entscheidet Arzt/Gesundheitsamt	Ja, auch Verdachtsfälle	

Kopfläuse		Ansteckungsfähigkeit besteht, so lange die Betroffenen mit Läusen befallen und nicht behandelt sind	nach Behandlung	Nein, aber Bestätigung der Sorgeberechtigten, das Behandlung durchgeführt wurde	Nein, aber Kontrolle nötig	Ja	
Augenerkrankungen							
Ansteckende Bindehautentzündung (Adeno-Konjunktiviitis)	5-12 Tage		Wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden	Ja	Möglich, nach Rücksprache mit dem Arzt	Ja	
Eitrige (Bakterielle) Bindehautentzündung			Nach Genesung	Nein	Nein, aber Kontrolle erforderlich	Nein	
Atemwegserkrankungen							
Atemwegserkrankung mit Fieber (>38°)			24 Stunden fieberfrei	Nein	Nein	Nein	
Covid-19	5-7 Tage	5-7 Tage, ansteckend 1-2 Tagen nach Infektion	48 Stunden nach Ende der Symptomatik	Nein	Nein, aber empfohlen	Ja	Ja, aber keine Standard-Impfung für Kinder
Influenza (echte Grippe)	1-2 Tage		Nach Genesung	Nein	Nicht erforderlich	Ja	Ja
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	3-10 Tage	Schon vor Auftritt der Bläschen	Nach Genesung (Bläschen ausgetrocknet)	Nein	Nicht erforderlich	Nein	
Ringelröteln	7-18 Tage	Bis zum Beginn des Ausschlags	Nach Genesung. Andere Sorgeberechtigte/Mitarbeiterinnen müssen informiert werden.	Nein	Nicht erforderlich	Nein	
Dreitagefieber	7-14 Tage		Nach Genesung	Nein	Nicht erforderlich	Nein	
Meningokokken Erkrankungen und Meningitis							
Meningokokken-Erkrankung	3-4 Tage	Bis 24h nach erfolgreicher Antibiotika-Therapie, vor Ausbruch infektiös	Nach erfolgreicher Therapie und Genesung	Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja, gegen bestimmte Erregerstämme
H1b - Meningitis	2- 10 Tage	Bis 24h nach erfolgreicher Antibiotika-Therapie, vor Ausbruch infektiös	Nach erfolgreicher Therapie und Genesung	Nein	Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja

* Das Kuratorium unserer Einrichtung hat das Recht zu beschließen, dass bei bestimmten Krankheiten ein ärztliches Attest vor Wiederzulassung eingeholt werden muss.